BU talerc 4320000(ache).qxd:BU 09.03.10 10:09 Page 1

ache

TALERC
cloridrato de epinastina

FORMAS FARMACÊUTICAS E APRESENTAÇÕES
Comprimidos revestidos - Xarope
Comprimidos revestidos de 10 mg: embalagens com 10 comprimidos.
Comprimidos revestidos de 20 mg: embalagem com 10 comprimidos.
Xarope: frascos com 50 ml acompanhados de copo-medida.

QUANTIDADES EM UNIDADES
Comprimidos revestidos de 10 mg
Contém: 10 comprimidos revestidos
Comprimidos revestidos de 20 mg
Contém: 10 comprimidos revestidos

VOLUME LÍQUIDO
Xarope
Conteúdo: 50 ml

USO ORAL

USO ADULTO E PEDIÁTRICO

COMPOSIÇÃO:
Cada comprimido revestido 10 mg contém:
cloridrato de epinastina .....10 mg
Excipientes: lactose monoidratada, amido, povidona, dióxido de silício, estearato de magnésio, hipromelose, eudragit, macrogol, talco, dióxido de titânio e silicona.

Cada comprimido revestido 20 mg contém:
cloridrato de epinastina .....20 mg
Excipientes: lactose monoidratada, amido, povidona, dióxido de silício, estearato de magnésio, hipromelose, eudragit, macrogol, talco, dióxido de titânio e silicona.

Cada 5 ml de xarope contém:
cloridrato de epinastina .....10 mg
Excipientes: glicirrizinato de amônio, fosfato de sódio monobásico diidratado, carmelose sódica, essência de cereja, essência de mentol, propilenoglicol, água purificada, sorbitol e hidróxido de sódio.

INFORMAÇÕES AO PACIENTE

- Como este medicamento funciona?
TALERC comprimidos revestidos/xarope possui atividade bloqueadora dos receptores H1 de grande seletividade e especificidade, com potente efeito antialérgico e anti-histamínico.

- Por que este medicamento foi indicado?
TALERC comprimidos revestidos/xarope é indicado para o tratamento de alergias.

- Quando não devo usar este medicamento?
TALERC NÃO DEVE SER USADO EM PACIENTES QUE APRESENTAM ALERGIA A QUAISQUER DOS COMPONENTES DO MEDICAMENTO. ESTE MEDICAMENTO É CONTRA-INDICADO A CRIANÇAS MENORES DE 6 ANOS DE IDADE.

- TALERC pode ser utilizado com outros medicamentos?
Não existe prova suficiente de que **TALERC** potencialize o efeito sedativo de hipnóticos, anti-histamínicos ou álcool. Entretanto, deve-se evitar o uso concomitante de tais substâncias.

- Durante o tratamento com TALERC pode-se tomar bebidas alcoólicas?
Evite a ingestão de bebida alcoólica durante o tratamento.

Atenção: Talerc na forma farmacêutica Xarope contém sorbitol, portanto, deve ser usado com cautela em portadores de Diabetes.

INFORME AO MÉDICO OU CIRURGIÃO-DENTISTA O APARECIMENTO DE REAÇÕES DESAGRADÁVEIS.

INFORME AO SEU MÉDICO OU CIRURGIÃO-DENTISTA SOBRE QUALQUER MEDICAMENTO QUE ESTEJA USANDO ANTES DO INÍCIO OU DURANTE O TRATAMENTO.

ESTE MEDICAMENTO NÃO DEVE SER UTILIZADO POR MULHERES GRÁVIDAS SEM ORIENTAÇÃO MÉDICA OU DO CIRURGIÃO DENTISTA.

INFORME LOGO AO SEU MÉDICO A OCORRÊNCIA DE GRAVIDEZ NA VIGÊNCIA DO TRATAMENTO OU APÓS O SEU TÉRMINO. INFORME AO MÉDICO SE ESTÁ AMAMENTANDO.

- Como devo usar este medicamento?
A via de administração é oral. O comprimido revestido de **TALERC** deve ser tomado sem mastigar, com um pouco de líquido. Talerc comprimidos revestidos não deve ser partido ou mastigado.

Para o tratamento de patologias dermatológicas alérgicas:
Adultos: tomar um comprimido de 20 mg, uma vez ao dia.

Para o tratamento de rinite alérgica:
Adultos: tomar um comprimido de 10 ou 20 mg, uma vez ao dia. A dose deve ser ajustada individualmente, de acordo com a gravidade dos sintomas.

Crianças de 6 a 12 anos: 5 a 10 mg (2,5 ml a 5 ml), uma vez ao dia.
No caso de esquecimento de administração (dose omitida), fazer uso tão logo se lembre, porém não utilizar dose dobrada.

PH 1036 - BU 05 - SAP 4320000 (A) 03/10

200 mm
160 mm

Siga corretamente o modo de usar. Não desaparecendo os sintomas, procure orientação médica ou de seu cirurgião-dentista.

Não use medicamento com o prazo de validade vencido. Antes de usar observe o aspecto do medicamento.

- Qual é o aspecto deste medicamento?
TALERC comprimidos revestidos possui a forma redonda, biconvexa, de cor variando de branco a amarelo.
TALERC xarope apresenta-se na forma de líquido límpido, incolor ou levemente amarelado com odor característico de cereja.

- Quais os males que este medicamento pode causar?
COMO REAÇÕES ADVERSAS RELATARAM-SE SONOLÊNCIA, DOR DE CABEÇA, FADIGA, SECURA DA BOCA, TONTURA E DESCONFORTO GASTRINTESTINAL.

- O que fazer se alguém usar uma grande quantidade deste medicamento de uma só vez?
Em caso de superdose, a conduta a ser adotada é a lavagem gástrica e/ou diurese forçada, além de tratamento sintomático.

- Onde e como devo guardar este medicamento?
Como todo medicamento, **TALERC** deve ser guardado em sua embalagem original até sua total utilização. Conservar em temperatura ambiente (temperatura entre 15 e 30°C). Proteger da luz e umidade. O xarope deve ser armazenado bem fechado.

- Qual o prazo de validade de TALERC?
O prazo de validade de **TALERC** comprimidos revestidos é de 24 meses a contar da data de sua fabricação indicada na embalagem do produto.
O prazo de validade de **TALERC** xarope é de 18 meses a contar da data de sua fabricação indicada na embalagem do produto.
Ao utilizar o medicamento, confira sempre seu prazo de validade. Nunca use medicamento com o prazo de validade vencido. Além de não obter o efeito desejado, as substâncias podem estar alteradas e causar prejuízo para a sua saúde.

TODO MEDICAMENTO DEVE SER MANTIDO FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS

DIZERES LEGAIS:
MS - 1.0573.0364
Farmacêutico Responsável:
Wilson R. Farias CRF-SP 9.555

Comprimidos revestidos:

Aché Laboratórios Farmacêuticos S.A.
Via Dutra, km 222,2 - Guarulhos - SP
CNPJ 60.659.463/0001-91 - Indústria Brasileira

Fabricado por:
Boehringer Ingelheim do Brasil Química e Farmacêutica Ltda
Itapecerica da Serra-SP

Xarope:

Aché Laboratórios Farmacêuticos S.A.
Via Dutra, km 222,2
Guarulhos - SP
CNPJ 60.659.463/0001-91
Indústria Brasileira
Número de lote, data de fabricação e prazo de validade: vide embalagem externa

SIGA CORRETAMENTE O MODO DE USAR; NÃO DESAPARECENDO OS SINTOMAS, PROCURE ORIENTAÇÃO MÉDICA.

PH 1036 - BU 05 - SAP 4320000 (A) 03/10