165 mm

achē

FLOGORAL

cloridrato de benzidamina

Spray e Creme Dental

APRESENTAÇÕES

Spray nos sabores menta e cereja: frasco com 30 ml.

Creme dental: bisnaga com 70 g.

Spray: USO BUCAL - Não ingerir
Creme dental: USO BUCAL - Não ingerir

USO ADULTO E PEDIÁTRICO ACIMA DE 6 ANOS

COMPOSIÇÕES COMPLETAS

Spray

Cada ml de spray menta contém:
cloridrato de benzidamina .....1,5 mg
Excipientes: álcool etílico, aroma de menta, glicerol, metilparabeno, polissorbato 20, sacarina sódica di-hidratada e água purificada.

Cada ml de spray cereja contém:
cloridrato de benzidamina .....1,5 mg
Excipientes: álcool etílico, aroma de cereja, glicerol, metilparabeno, polissorbato 20, sacarina sódica di-hidratada e água purificada.

Creme dental

Cada g contém:
cloridrato de benzidamina .....5 mg
Excipientes: aroma de menta, amarelo de quinolina, corante azul FDC nº1, dióxido de silício, fosfato de cálcio dibásico di-hidratado, glicerol, carmelose sódica, laurilsulfato de sódio, mentol, metilparabeno, propilparabeno, sacarina sódica di-hidratada e água purificada.

INFORMAÇÕES AO PACIENTE

- O que é e para que serve FLOGORAL (cloridrato de benzidamina)?

FLOGORAL (cloridrato de benzidamina) é um medicamento que apresenta propriedades anti-inflamatória, analgésica e anestésica, indicado para o tratamento de processos inflamatórios e dolorosos da boca e garganta.

- Como FLOGORAL (cloridrato de benzidamina) deve ser armazenado?

Como todo medicamento, FLOGORAL (cloridrato de benzidamina) deve ser guardado em sua embalagem original, conservado em temperatura ambiente (entre 15 e 30°C), protegido da luz e umidade.

- Qual o prazo de validade de FLOGORAL (cloridrato de benzidamina)?

O prazo de validade de FLOGORAL (cloridrato de benzidamina) é de 24 meses após a data de fabricação impressa nas embalagens do produto.
Ao utilizar o medicamento, confira sempre seu prazo de validade.
NUNCA USE MEDICAMENTO COM PRAZO DE VALIDADE VENCIDO. Além de não obter o efeito desejado, as substâncias podem estar alteradas e causar prejuízo para a sua saúde.

- FLOGORAL (cloridrato de benzidamina) pode ser utilizado durante a gravidez e amamentação?

Como regra geral, você deve evitar qualquer medicamento neste período.
Informe seu médico a ocorrência de gravidez na vigência do tratamento ou após o seu término.
Informar ao médico se está amamentando.

- Como FLOGORAL (cloridrato de benzidamina) deve ser utilizado?

Spray: fazer 2 a 6 nebulizações ao dia nas áreas inflamadas da boca e garganta.

Creme dental: escovar os dentes e as gengivas 3 a 4 vezes ao dia, após as refeições.
Siga a orientação do seu médico respeitando sempre os horários, as doses e a duração do tratamento.
Não interromper o tratamento sem o conhecimento do seu médico.

- Quais são as possíveis reações adversas com o uso de FLOGORAL (cloridrato de benzidamina)?

Informe seu médico o aparecimento de reações desagradáveis como a sensibilização decorrente do uso prolongado de FLOGORAL (cloridrato de benzidamina). Nesse caso, o tratamento deve ser interrompido.

TODO MEDICAMENTO DEVE SER MANTIDO FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS.

- Quando FLOGORAL (cloridrato de benzidamina) não deve ser utilizado?

FLOGORAL (cloridrato de benzidamina) não deve ser utilizado por pacientes que tenham alergia ao cloridrato de benzidamina ou aos demais componentes da fórmula.

- Quando o uso de FLOGORAL (cloridrato de benzidamina) requer cuidados especiais?

Em caso de insuficiência renal, consulte seu médico antes de utilizar FLOGORAL (cloridrato de benzidamina).
Informe seu médico sobre qualquer medicamento que

PH 55 - BU 20- SAP 4081607 (D) 11/12

125 mm

esteja usando, antes do início, ou durante o tratamento. Não são conhecidas interações com outros medicamentos nem outras formas de interação.

- Pacientes diabéticos podem fazer uso de FLOGORAL (cloridrato de benzidamina)?

FLOGORAL (cloridrato de benzidamina) spray e creme dental não contêm açúcar.
Se você for diabético, certifique-se com seu médico sobre o uso do produto.

- Em caso de ingestão acidental ou superdosagem do produto, que providências tomar?

Em caso de ingestão acidental ou superdosagem entre imediatamente em contato com seu médico ou procure um pronto-socorro, informando a quantidade exata ingerida do produto, horário da ingestão e os sintomas.

NÃO TOME REMÉDIO SEM O CONHECIMENTO DO SEU MÉDICO. PODE SER PERIGOSO PARA A SAÚDE.

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

CARACTERÍSTICAS

FLOGORAL (cloridrato de benzidamina) tem como princípio ativo o cloridrato de benzidamina, que possui ações anti-inflamatória e analgésica, sendo amplamente utilizado no tratamento de afecções que apresentem como fator comum a dor e a tumefação. Além disso, FLOGORAL (cloridrato de benzidamina) exerce ações anestésica local e histo-protetora, estimula a cicatrização e acelera o processo de recuperação dos tecidos lesados.
O cloridrato de benzidamina é um derivado do indazol, não apresentando, portanto, os efeitos colaterais dos compostos esteroides.

INDICAÇÕES

FLOGORAL é indicado em aftas (estomatites, mucosites e outras manifestações inflamatórias da mucosa bucal e da língua); na dor de dente; na dor e inflamação da garganta e nos sintomas do resfriado e da gripe (anginas, amigdalites, faringites e laringites) e na dor pós-traumática (após procedimentos odontológicos, otorrinolaringológicos e bucomaxilofaciais como amigdalectomias, fraturas de mandíbula, cistos maxilares, calculoses salivares, extração dentária).

CONTRAINDICAÇÕES

HIPERSENSIBILIDADE AO CLORIDRATO DE BENZIDAMINA OU AOS DEMAIS COMPONENTES DA FÓRMULA.

PRECAUÇÕES E ADVERTÊNCIAS

SENDO FLOGORAL (CLORIDRATO DE BENZIDAMINA) ABSORVIDO PELA MUCOSA ORAL E EXCRETADO PRATICAMENTE INALTERADO NA URINA, DEVE-SE LEVAR EM CONSIDERAÇÃO UMA POSSÍVEL AÇÃO SISTÊMICA EM PACIENTES COM INSUFICIÊNCIA RENAL.

USO NA GRAVIDEZ E LACTAÇÃO

COMO REGRA GERAL, DEVE-SE EVITAR QUALQUER MEDICAMENTO NESTE PERÍODO.

FLOGORAL (CLORIDRATO DE BENZIDAMINA) SPRAY E CREME DENTAL NÃO CONTÊM AÇÚCAR.

INTERAÇÕES MEDICAMENTOSAS

Não são conhecidas interações com outros medicamentos nem outras formas de interação.

REAÇÕES ADVERSAS

O USO PROLONGADO DE FLOGORAL (CLORIDRATO DE BENZIDAMINA) PODE CAUSAR SENSIBILIZAÇÃO. NESSE CASO, O TRATAMENTO DEVE SER INTERROMPIDO.

POSOLOGIA

Spray: fazer 2 a 6 nebulizações ao dia nas áreas inflamadas da boca e garganta.

Creme dental: escovar os dentes e as gengivas 3 a 4 vezes ao dia, após as refeições.

SUPERDOSAGEM

Em caso de ingestão acidental de doses elevadas, poderão ocorrer agitação, ansiedade, alucinações e convulsões. No caso de intoxicação, procure imediatamente assistência médica.

PACIENTES IDOSOS

Não há até o momento estudos específicos relacionando a idade ao uso do produto.

SIGA CORRETAMENTE O MODO DE USAR; NÃO DESAPARECENDO OS SINTOMAS, PROCURE ORIENTAÇÃO MÉDICA.

Número do lote, data de fabricação e prazo de validade: vide embalagem externa.

MS - 1.0573.0313

Farmacêutica Responsável:
Gabriela Mallmann
CRF-SP nº 30.138

Aché Laboratórios Farmacêuticos S.A.
CNPJ 60.659.463/0001-91
Via Dutra, km 222,2
Guarulhos - SP
Indústria Brasileira

CAC
Central de atendimento a clientes
0800 701 6900
cac@ache.com.br
8:00 h às 18:00 h (seg. a sex.)

PH 55 - BU 20- SAP 4081607 (D) 11/12