

# achē

## carnabol kids

### polivitamínico + associação

#### APRESENTAÇÃO

Suspensão oral: frasco de 120 ml + copo dosador de 10 ml

#### USO ORAL

#### USO PEDIÁTRICO

#### COMPOSIÇÃO

Cada 10 ml de Carnabol Kids suspensão oral contém:

cianocobalamina .....	6 mcg
cloridrato de lisina.....	100 mg
cloridrato de levocarnitina.....	75 mg
cloridrato de piridoxina.....	2 mg
nicotinamida.....	10 mg
nitrito de tiamina .....	4,8 mg
fosfato sódico de riboflavina.....	1,5 mg

Excipientes: ácido cítrico monohidratado, aroma de cola, carmelose sódica, celulose microcristalina, ciclamato sódico, citrato de sódio di-hidratado, cloreto de sódio, simeticona, goma xantana, glicerol, metilparabeno, propileno glicol, propilparabeno, sacarina sódica di-hidratada, sorbitol e água purificada.

#### INFORMAÇÕES AO PACIENTE

##### 1. PARA QUE ESTE MEDICAMENTO É INDICADO?

Carnabol Kids é destinado ao tratamento e prevenção de carências nutricionais, determinando uma melhora no estado geral do organismo das crianças em fase de crescimento.

Carnabol Kids pode auxiliar na prevenção das deficiências das vitaminas do complexo B e dos aminoácidos componentes da sua fórmula, nos períodos de crescimento acelerado e em casos de dietas restritivas e inadequadas.

##### 2. COMO ESTE MEDICAMENTO FUNCIONA?

Carnabol Kids é uma associação das vitaminas do complexo B (cianocobalamina (B12), piridoxina (B6), nicotinamida (B3), tiamina (B1) e riboflavina (B2)) com os derivados de aminoácidos lisina e levocarnitina, indicado nos estados de carências nutricionais. Os aminoácidos cloridrato de levocarnitina e cloridrato de lisina atuam na síntese proteica (produção de proteínas) e no metabolismo dos lipídeos (gorduras) e o complexo B que atua em diversos processos do organismo como, por exemplo, o metabolismo energético, formação dos glóbulos brancos e vermelhos, funções do sistema nervoso central e periférico, síntese proteica, formação dos hormônios, dentre outras.

##### 3. QUANDO NÃO DEVO USAR ESTE MEDICAMENTO?

Este medicamento é contraindicado para uso por pacientes com suspeita de deficiência de vitamina B12 sem causa definida, nem para pacientes portadores de doenças hepáticas (no fígado), renais (nos rins) e úlcera péptica (lesão no estômago).

Carnabol Kids não é indicado para pacientes que apresentem hipersensibilidade (alergia) a quaisquer dos componentes de sua fórmula.

##### 4. O QUE DEVO SABER ANTES DE USAR ESTE MEDICAMENTO?

Se você é diabético e recebe carnitina associado à insulina ou outros medicamentos hipoglicemiantes (medicamentos que baixam os níveis de açúcar no sangue), você deve ser monitorado para evitar casos de hipoglicemia (nível baixo de açúcar no sangue).

Se você tem gota deve ser monitorado quanto aos níveis de ácido úrico quando recebe nicotinamida. A carnitina não deve ser utilizada se você possui cardiopatias (doenças do coração) sem supervisão médica.

270 mm



**Este medicamento não deve ser utilizado por mulheres grávidas sem orientação médica ou do cirurgião-dentista.**

Carnabol Kids não deve ser administrado ao mesmo tempo com medicamentos contendo levodopa, cimetidina, carbamazepina, aminoglicosídeos ou teofilina nem com medicamentos para redução da lipíde-mia (concentração de lipídeos no sangue).

As vitaminas de Carnabol Kids podem interferir na dosagem sérica de teofilina, ácido úrico e urobilino-gênio e em altas doses pode interferir nas dosagens das catecolaminas urinárias (falso-positivo).

**Informe ao seu médico ou cirurgião-dentista se você está fazendo uso de algum outro medicamento.**

#### **5. ONDE, COMO E POR QUANTO TEMPO POSSO GUARDAR ESTE MEDICAMENTO?**

Você deve conservar Carnabol Kids em temperatura ambiente (entre 15 e 30°C). Protegido da luz e da umidade.

**Número de lote e datas de fabricação e validade: vide embalagem.**

**Não use medicamento com o prazo de validade vencido. Guarde-o em sua embalagem original.**

Suspensão homogênea (uniforme) amarela.

**Antes de usar, observe o aspecto do medicamento. Caso ele esteja no prazo de validade e você ob-serve alguma mudança no aspecto, consulte o farmacêutico para saber se poderá utilizá-lo.**

**TODO MEDICAMENTO DEVE SER MANTIDO FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS.**

#### **6. COMO DEVO USAR ESTE MEDICAMENTO?**

**Crianças:** deve tomar um copo dosador (10 ml), meia hora antes das principais refeições.

Não utilizar Carnabol Kids por período prolongado sem orientação do seu médico.

A dose máxima diária não deverá ultrapassar 3 copos dosadores.

**Siga corretamente o modo de usar. Em caso de dúvidas sobre este medicamento, procure orienta-ção do farmacêutico. Não desaparecendo os sintomas, procure orientação de seu médico ou cirur-gião-dentista.**

**Agite antes de usar.**

#### **7. O QUE DEVO FAZER QUANDO EU ME ESQUECER DE USAR ESTE MEDICAMENTO?**

Em casos de esquecimento de uma dose, aguarde a próxima dose e continue tomando normalmente.

**Em caso de dúvidas, procure orientação do farmacêutico ou de seu médico, ou cirurgião-dentista.**

#### **8. QUAIS OS MALES QUE ESTE MEDICAMENTO PODE ME CAUSAR?**

Você poderá apresentar as seguintes reações desagradáveis ao utilizar Carnabol Kids:

- Alterações gastrointestinais: náuseas (enjoo), vômitos, diarreias, constipação intestinal (intestino pre-so), dores abdominais e úlcera péptica (ferida no estômago);
- Alterações dermatológicas: “*rash*” cutâneo (manchas vermelhas na pele), eritema (vermelhidão) de fa-ce, urticária (alergia), prurido (coceira) generalizado e hiperqueratose (excesso de produção de queratina);
- Alterações renais: síndrome de fanconi (distúrbio raro da função excretora renal) e falência renal (dos rins);
- Alterações hematológicas: hipercolesterolemia (nível alto de colesterol no sangue);
- Alteração no sistema nervoso central: neuropatia periférica (perda sensorial);
- Alterações respiratórias: dispneia (falta de ar) e broncoespasmo (contração da musculatura dos brôn-quios) relacionados à hipersensibilidade (alergia) à tiamina;
- Altas doses de piridoxina podem causar coloração amarelada da urina.

Você poderá apresentar também os seguintes efeitos indesejáveis: deficiência de ácido fólico e hipoto-nia (diminuição do tônus muscular).

**Informe ao seu médico, cirurgião-dentista ou farmacêutico o aparecimento de reações indesejá-veis pelo uso do medicamento. Informe também à empresa através do seu serviço de atendimento.**

#### **9. O QUE FAZER SE ALGUÉM USAR UMA QUANTIDADE MAIOR DO QUE A INDICADA DESTE MEDICAMENTO?**

Não há relatos de superdosagem com Carnabol Kids.

**Em caso de uso de grande quantidade deste medicamento, procure rapidamente socorro médico e leve a embalagem ou bula do medicamento, se possível.**

**Em caso de intoxicação ligue para 0800 722 6001, se você precisar de mais orientações sobre co-mo proceder.**

#### **DIZERES LEGAIS**

MS - 1.0573.0390

Farmacêutica Responsável: Gabriela Mallmann - CRF-SP nº 30.138

Registrado por:

**Aché Laboratórios Farmacêuticos S.A.**

Av. Brigadeiro Faria Lima, 201 - 20º andar - São Paulo - SP

CNPJ 60.659.463/0029-92 - Indústria Brasileira

Fabricado por:

**Aché Laboratórios Farmacêuticos S.A.**

Guarulhos - SP

**Siga corretamente o modo de usar, não desaparecendo os sintomas procure orientação médica.**

**Esta bula foi aprovada pela ANVISA em 06/09/2016.**



PH 3913 BU 02 VP CNPJ SAP 4343426 10/17

